Association de la Grande Cariçaie
Chemin de la Cariçaie 3
1400 Cheseaux-Noréaz
Suisse

T +41 24 425 18 88
info@grande-caricaie.ch
www.grande-caricaie.ch

# RECENSEMENT INTERNATIONAL DES OISEAUX D'EAU

## SYNTHESE DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT

**JANVIER 2018**

**En bref**

Le total d'oiseaux d'eau recensé ce mois de janvier 2018 s'élève à **78'952 individus** (Lac de Neuchâtel: 74'162, Lac de Morat: 4'790). Le secteur ayant accueilli le plus d'oiseaux est celui de **Chevroux -Estavayer** (NEU 05).

Le **Fuligule morillon**, avec un effectif de **17'788 individus**, a été l'espèce la plus abondante lors de ce recensement.

*La grisaille matinale sur le lac de Neuchâtel a tout de même permis de belles observations d'oiseaux nordiques, comme ces Garrots à œil d'or proches du port d'Yvonand. © AGC*

## Un recensement dans la moyenne

Chaque année, les lacs de Suisse accueillent des oiseaux d'eau nordiques qui profitent de conditions climatiques clémentes et d'un bon apport en nourriture pour hiverner chez nous. Certains viennent en faible quantité, comme les Plongeons, les Macreuses ou encore les Garrots à œil d'or, tandis que d'autres comme les Fuligules ou les Foulques peuvent compter plusieurs milliers d'individus.

Contrairement au recensement tempétueux du mois de novembre 2017, les conditions furent calmes et idéales pour le recensement international de janvier. Seules les grisailles matinales sont restées tenaces, réduisant la visibilité au loin dans certains secteurs du lac de Neuchâtel.

Avec 78'952 individus répartis sur les lacs de Neuchâtel et Morat, toutes espèces confondues, ce recensement fut dans la norme de ces dernières saisons (Figure 1). L'année passée, le climat suisse fut marqué par un hiver très doux et les effectifs des oiseaux d'eau hivernants avaient augmenté entre le recensement de novembre et celui de janvier (environ 14'000 oiseaux en plus en janvier), ce qui est un fait plutôt rare. Cette année, les conditions plus proche des normes hivernales ont fait que les oiseaux d'eau ont été légèrement inférieurs en nombre lors du recensement de janvier. La rive sud du lac de Neuchâtel a accueilli près de 80% du total des oiseaux du lac. 35% de ceux-ci étaient présent dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale, une valeur assez faible, mais due principalement au très grand rassemblement dans les Grèves de la Corbière (28'236 oiseaux, c'est-à-dire 38% de l'effectif total du lac !).




*Figure 1 / Total d'oiseaux d'eau dénombrés en janvier sur le Lac de Neuchâtel depuis 1951. L'axe vertical indique le nombre d'individus recensés, toutes espèces confondues.*

Malgré une baisse de ses effectifs dans l'ensemble de l'Europe et un hivernage maintenu plus au nord-est de notre pays de nos jours, le Fuligule morillon fait bonne figure et a été l'espèce la plus abondante avec 17'788 individus recensés. C'est un signe encourageant en regard du comptage particulièrement bas du recensement de novembre. Peu nombreux en Suisse avant le milieu des années 1970, le Fuligule morillon a profité de l'introduction de la Moule zébrée (une espèce d'origine asiatique) à cette époque pour hiverner en grand nombre sur nos lacs. Extrêmement nombreux alors (plus de 65'000 individus en 1982 !), le Fuligule morillon a ensuite vu ses effectifs se réduire (non seulement en Suisse, mais en Europe

en général). A présent, on le retrouve en même nombre environ que le Fuligule milouin sur le lac de Neuchâtel (Figure 2).




*Figure 2 | Effectifs des Fuligules milouins et morillons sur le lac de Neuchâtel lors des recensements de janvier depuis 1951.* *Crédit photo - Fuligule morillon : V. Keller.*

Chez les oiseaux d'eau plongeurs, une surprise ressort du recensement de cette année : le Grèbe à cou noir présente des effectifs près de 4,5 fois plus élevés que la norme de ces 5 dernières années. Pas moins de 752 individus ont été estimés sur le lac de Neuchâtel, alors que la moyenne 2012-2017 était de 162 (± 77) individus (Figure 3). Il semblerait que cela corresponde à un afflux généralisé au niveau suisse, car les effectifs du lac de Constance sont également élevés pour cette espèce (2'178 individus, près du double de l'effectif moyen en janvier pour ce lac).




*Figure 3 | Effectifs du Grèbe à cou noir sur le lac de Neuchâtel lors du recensement de janvier depuis1951.*

Le niveau du lac était haut lors de ce comptage (429.30 m environ pour le lac de Neuchâtel), ce qui ne favorise pas les espèces de canards de « surface » (qui ne plongent pas pour se nourrir) pour accéder à leur nourriture. La Sarcelle d'hiver était donc bien moins présente que l'année passée sur les lacs de Neuchâtel et Morat (300 cette année contre 895 l'an passé, ce qui constituait un record absolu). Les Canards colverts et les Canards siffleurs, dans le même cas de figure, ont également été légèrement en dessous de la moyenne cette année.

La Tadorne casarca n'a pas été vue cette année sur le lac de Neuchâtel ce 14 janvier. C'est une observation notable car cette espèce non-indigène (issue principalement des populations férales des Pays-Bas) était présente chaque année depuis 2008, avec en moyenne une quarantaine d'individus lors des 5 derniers recensements de janvier. Ses effectifs étaient bas également du côté du lac de Constance (217 individus), bien qu'il s'agisse pourtant du plus grand « réservoir » de cette espèce en Suisse (plus de 600 individus en moyenne au mois de janvier). Le lac de Morat en a tout de même accueilli 22, une valeur élevée pour ce lac.

Du côté des Laridés, une belle diversité était présente avec l'observation de deux Goélands brun (un sur chaque lac) et d'un Goéland pontique proche d'Yverdon. Beaucoup de Goélands leucophées ont été observé sur le lac de Morat avec 364 individus (record de janvier pour ce lac) et la Mouette rieuse a également été bien représentée avec près de 4'000 individus, la majeure partie sur le lac de Neuchâtel. Le Goéland cendré était présent sur les deux lacs, mais avec un effectif en dessous de la moyenne avec 142 individus. Il était majoritairement présent dans le secteur des Grèves de la Corbière sur le lac de Neuchâtel.

Enfin, les Oies cendrées ont été très peu nombreuses sur les lacs lors de ce comptage. Même le lac de Morat qui voit habituellement un bon nombre d'oies n'en a compté que 135 cette année, alors que la moyenne des 5 dernières années était légèrement inférieure à 350 individus. Ce faible nombre est probablement dû au fait qu'une partie des oies se nourrissaient dans les terres agricoles à proximité. Ce comportement fait que les comptages d'oiseaux d'eau ne sont pas forcément représentatifs de l'effectif réel pour cette espèce, de même pour les Laridés qui se nourrissent également dans les champs.

Plus anecdotique, on pourra aussi noter la présence d'un Grèbe esclavon dans le secteur reliant Vaumarcus à Auvernier, ainsi qu'un Plongeon catmarin aperçu à l'extrémité nord du lac de Neuchâtel.

Merci à toutes les personnes impliquées dans ces recensements internationaux, et notamment aux responsables de secteurs qui ont tous été très rapides à envoyer leurs résultats. Le prochain recensement des oiseaux d'eau sur la rive sud du lac de Neuchâtel aura lieu le 18 février. Quant au prochain recensement international, il est d'ores et déjà agencé au 18 novembre 2018. Nous espérons vous y retrouver nombreux le long des rives des lacs et cours d'eau de Suisse !

Christophe Sahli Champ-Pittet, 1.02.2018

M:\1_Connaissance\MO_Monitoring\MO_ORO_Oiseaux_eau_OROEM\Résultats_OROEM\Resultats_Recensements_Internationaux\2018\Janvier\Rapport_Oiseaux_Eau_Janvier_2018.docx