



Association de la Grande Cariçaie
Chemin de la Cariçaie 3
1400 Cheseaux-Noréaz
Suisse

T +41 24 425 18 88
info@grande-cariçaie.ch
www.grande-cariçaie.ch

Recensement international des oiseaux d'eau

Synthèse des lacs de Neuchâtel et de Morat

Janvier 2026

RESULTATS DU COMPTAGE

Après deux hivers faibles, les effectifs d'oiseaux du lac de Neuchâtel sont revenus à des valeurs plus habituelles en 2026. Et pour une fois, soulignons-le, les bénévoles ont pu profiter de conditions météorologiques particulièrement favorables, une éclaircie entre deux jours de brouillard prononcé dans la région des Trois Lacs. Ces bons effectifs totaux peuvent être les conséquences d'un climat automnal proche de la norme et d'un mois de janvier 2026 relativement froid par rapport aux deux dernières éditions.

Les effectifs cumulés des deux lacs ont été d'un peu plus de 83'800 oiseaux dénombrés, ce qui figure dans la moyenne des 10 dernières années, mais qui est bien plus haut que les deux dernières éditions où les oiseaux avaient compté près de 20'000 individus de moins. En revanche, peu de surprise concernant les espèces les plus abondantes, les Fuligules milouins formant toujours largement la majeure partie des oiseaux du lac avec 27'860 individus estimés. Plusieurs espèces de canards de surface ont montré des effectifs élevés, probablement en réponse à la vague de froid de la première quinzaine de janvier, et également favorisés par un niveau du lac bas.



Figure 1 : Les roselières lacustres de Crevel, entre Cheyres et Yvonand, ont abrité un joli groupe de Fuligules et Nettes rousses lors du comptage international du 17 janvier 2026.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU RECENSEMENT

Le total du comptage de ce mois de janvier est de **83'882 oiseaux** (lac de Neuchâtel : 76'998 oiseaux, Figure 2 ; lac de Morat : 6'884 oiseaux, Figure 3). Le Fuligule milouin a été l'espèce la plus abondante avec 27'860 individus au total. Par rapport au mois de novembre dernier, les oiseaux étaient répartis de manière plus homogène sur le lac, le secteur d'Estavayer-Le-Lac – Chevroux restant le plus peuplé mais les oiseaux investissant un peu plus les roselières de Crevel et les eaux peu profondes du tronçon Yverdon-Yvonand. Le Fuligule morillon et la Foulque macroule devançant ensuite la Nette rousse parmi les espèces les plus abondantes.

LAC DE NEUCHATEL




Figure 2 : Total d'oiseaux d'eau dénombrés en janvier sur le **lac de Neuchâtel** depuis 1951 (toutes espèces confondues). Moyenne₂₀₂₁₋₂₀₂₅ $\pm$ SD = 66'482 $\pm$ 14'431 individus. Une courbe d'évolution lissée a été appliquée en superposition (régression locale).

Avec un effectif global de 76'998 individus, le résultat du comptage du lac de Neuchâtel se situe dans la moyenne supérieure des 5 dernières années (moyenne₂₀₂₁₋₂₀₂₅ $\pm$ SD = 66'482 $\pm$ 14'431 individus ; Figure 2). C'est en effet bien plus que les deux dernières années, aux hivers très doux. La part des oiseaux présents le long des réserves naturelles de la rive Sud du lac de Neuchâtel est de 51'790 oiseaux, soit 67.3 % des effectifs de ce lac. Cela indique une bonne homogénéité dans la répartition des grands groupes d'oiseaux : l'an dernier cette proportion s'élevait par exemple à plus de 80%, la rive nord du lac ayant été bien moins fréquentée. Un total de 21'098 oiseaux se trouvaient dans les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance nationale et internationale (réserves OROEM), représentant 27.4 % des oiseaux du lac, des valeurs tout à fait habituelles dans le cadre des recensements hivernaux.

Un tiers des oiseaux du lac (principalement des Fuligules milouins, des Foulques macroules et des Nettes rousses) étaient présents entre Estavayer-le-Lac et Chevroux (23'281 individus), ce qui est maintenant devenu habituel lors de ces comptages. Les roselières lacustres de la rive nord du lac, situées de Corcelettes à Colombier suivent ensuite avec 21'138 individus (ayant néanmoins perdu environ 7'000 oiseaux depuis le mois de novembre). Les secteurs de Yvonand-Cheyres et Yverdon-Yvonand, tous deux constitués de réserves OROEM, ont en revanche gagné en importance par rapport au mois de novembre, atteignant respectivement 7'686 et 5'753 individus.

LAC DE MORAT




Figure 3 : Total d'oiseaux d'eau dénombrés en janvier sur le **lac de Morat** depuis 1967 (toutes espèces confondues). Moyenne₂₀₂₁₋₂₀₂₅ $\pm$ SD = 4'678 $\pm$ 1'117 individus. Une courbe d'évolution lissée a été appliquée en superposition (régression locale).

L'effectif de 6'884 individus figure parmi les hautes valeurs du lac de Morat (moyenne₂₀₂₁₋₂₀₂₅ = 4'678 $\pm$ 1'117 ind. ; Figure 3). Les secteurs des extrémités Sud et Nord du lac, formant également les réserves OROEM de ce lac, ont accueilli 55.2 % des effectifs (3'800 ind.). Cette proportion est toujours bien plus importante sur le lac de Morat que sur celui de Neuchâtel car les zones OROEM sont situées aux extrémités du lac et englobent l'essentiel des zones les plus naturelles et protégées des dérangements de ce lac.

Des nouveaux records de janvier ont été atteints pour ce lac pour le Cygne tuberculé (111 ind.), la Nette rousse (581 ind.) et la Sarcelle d'hiver (167 ind.), ainsi que des valeurs élevées pour la Foulque macroule (1'983 ind.), le Canard chipeau (220 ind.) et le Canard siffleur (98 ind.).

DONNÉES REMARQUABLES

Principaux canards de surface et Cygnes

Pratiquement tous les canards de surface (à l'exception du Canard colvert) ont affiché de hauts effectifs lors de comptage, ce qui laisse supposer un mouvement global de population en provenance de régions plus nordiques. La **Sarcelle d'hiver** notamment, en plus de son effectif record sur le lac de Morat, a vu son 3^{ème} plus haut total sur le lac de Neuchâtel (711 ind.).

18 **Cygnes chanteurs** ont été observés sur le lac de Neuchâtel, et 12 sur celui de Morat. Une belle augmentation depuis le mois de novembre et un bon effectif global après quelques récentes années de faible présence. Le **Cygne tuberculé** était très présent ce mois (973 ind.), faisant oublier les faibles années 2020-2024. Aucun Cygne de Bewyck n'a été signalé cette année.




Figure 4 : Effectifs du Cygne tuberculé lors des recensements de janvier sur le lac de Neuchâtel, depuis 1951 (973 individus en janvier 2026).

Principaux canards plongeurs et Foulques

Le **Fuligule milouin** est l'espèce la plus abondante lors des comptages hivernaux. Avec 27'860 ind. au total sur les deux lacs lors de ce mois de janvier (mais l'essentiel sur le lac de Neuchâtel), il s'agit à nouveau d'une année de forte présence. Les 26'988 ind. du lac de Neuchâtel représentent la 3^{ème} plus haute donnée de cette espèce depuis le début des recensements pour ce lac (Figure 5). Le **Fuligule morillon** est dans la moyenne avec 15'298 ind., mais on remarque tout de même quelques années aux effectifs clairement inférieurs durant ces derniers 20 ans en réponse aux hivers doux. On reste évidemment très loin des effectifs dépassant occasionnellement les 40'000 individus lors de la période 1980-2000 (avec toutefois de grandes fluctuations possibles en fonction des hivers). Les individus qui hivernent en Suisse s'installent de plus en plus tardivement : une diminution est progressivement observée lors du comptage de novembre depuis le début des années 2000, tandis que la tendance du mois de janvier est plus stable. Les oiseaux repartent ensuite de plus en plus tôt en fin d'hiver vers leurs sites de reproduction.




Figure 5 : Effectifs du Fuligule milouin lors des recensements de janvier sur le lac de Neuchâtel, depuis 1951 (26'988 individus en 2026). Comme pour le Fuligule morillon, l'évolution de la population hivernante a été spectaculaire, favorisée par l'amélioration de la qualité des eaux, la prolifération de la Moule zébrée et l'accroissement des algues characées.

Sur le lac de Neuchâtel, la **Nette rousse** a été plutôt faiblement présente, avec seulement 7'742 ind., mais les 581 ind. du lac de Morat sont en revanche un nouveau record pour ce lac. Enfin, la **Foulque macroule** était bien présente avec 9'969 ind. sur le lac de Neuchâtel et 1'983 ind. sur le lac de Morat, ce qui est légèrement supérieur à sa moyenne récente ($\text{moyenne}_{2021-2025} = 6'844 \pm 1'071$ ind. sur le lac de Neuchâtel).

Laridés

Les Laridés font partie des oiseaux d'eau les plus connus du grand public. Leur recensement dans le cadre du recensement nationale et international des oiseaux d'eau est cependant lacunaire car ils se nourrissent volontiers dans les terres agricoles en journée et échappent ainsi en bonne partie aux comptages, effectués sur les plans d'eau. Comme cette « erreur » est répétée d'année en année, il est tout de même intéressant de comptabiliser ces espèces, les changements sur les lacs étant probablement en partie proportionnels à ceux de la population locale dans son ensemble.

Les **Goélands cendrés** ont montré une bonne présence avec 265 ind. observés, tandis que les **leucophées** sont restés très proches de leur moyenne de janvier avec 1'155 ind.. Il est fort probable que les Goélands leucophées soient bien plus nombreux en réalité, en raison de leur alimentation dans les terres agricoles comme indiqué ci-dessus. Un **Goéland brun** a été vu à Yverdon, ainsi que deux **Mouettes mélanocéphales**, qui figurent parmi les raretés de ce comptage. La **Mouette rieuse** reste (de peu) la plus abondante de ces espèces sur le lac avec 1'557 ind., mais montre une lente tendance déclinante depuis les années 1990.

Autres espèces remarquables

Les **Grands Cormorans** étaient bien présents également lors de ce comptage mais tout de même proche de leur moyenne, avec 502 ind. sur le lac de Neuchâtel et 88 ind. sur celui de Morat. Beaucoup de **Plongeurs arctiques** ont été observés, cette espèce signant ici son 3^{ème} meilleur recensement avec 56 individus (Figure 6). C'est la seule espèce de Plongeon qui a été signalée lors du comptage.




Figure 6 : Effectifs du Plongeon arctique lors des recensements de janvier sur le lac de Neuchâtel, depuis 1951.

Malgré le froid de début janvier, les conditions n'ont pas poussé le **Garrot à œil d'or** à descendre davantage au Sud pour hiverner sur nos lacs : il été très peu présent, comme en novembre, avec

seulement 64 ind. dénombrés, soit son minimum depuis 1972 (Figure 7). A l'opposé, le **Fuligule nyroca** a égalisé son record de 2025 sur le lac de Neuchâtel avec 20 individus mais il a cette fois été absent du lac de Morat. 3 **Harles piettes** ont été recensés (2 au Fanel et un aux Grèves de Cheseaux) et un **Grèbe jougris** est régulièrement visible cet hiver à Yverdon. Un petit groupe de 10 **Grues cendrées** passe également l'hiver dans la région, et vient chaque nuit au dortoir sur les bancs de sable du Chablais de Cudrefin.




Figure 7 : Effectifs du Garrot à œil d'or lors des recensements de janvier sur le lac de Neuchâtel, depuis 1951.

Chez les grandes raretés, un potentiel **Fuligule de Baer** au plumage de type femelle a été recensé au port de Hauterive. Ce canard d'origine sud-asiatique est une espèce très rare au niveau mondial et en danger critique d'extinction. La plupart des observations réalisées hors de sa zone de répartition habituelle concernent des individus échappés de captivité. L'oiseau de Hauterive étant non-bagué et de comportement farouche, la détermination de son origine sera compliquée pour la Commission de l'avifaune suisse (CAVS), chargée de traiter de la validité des observations d'oiseaux rares en Suisse.

Néozoaires / espèces échappées de captivité

Chez les néozoaires, l'**Ouette d'Egypte** a comptabilisé 31 individus et le **Tadorné casarca** 59 individus, des effectifs proches de leur moyenne récente. Deux **Canards mandarins** ont été vus, l'un dans le secteur de La Raisse-Vaumarcus sur le lac de Neuchâtel, et le deuxième en rive Est du lac de Morat.

DÉTAILS DES DONNÉES ET PROCHAIN RECENSEMENT

Les données de ces recensements sont mises à disposition interactivement sur le site internet de l'Association de la Grande Cariçaie. Ils permettent de consulter les évolutions pour toutes les espèces, sur les deux lacs : <https://grande-caricaie.ch/fr/recherche/suivis-des-oiseaux/>.

L'Association de la Grande Cariçaie remercie chaleureusement les bénévoles pour leur travail sur le terrain et pour la transmission rapide des résultats. Le prochain comptage national des oiseaux d'eau aura lieu le **dimanche 15 novembre 2026** sur les lacs de Neuchâtel et Morat.

Christophe Sahli

Cheseaux-Noréaz, 10.02.2026